

Den evige kamp mod skadedyrene

SORTE FLUER

Den lille sorte flue er ikke nogen flue, derimod en lille sort myg, der lægger sine æg i jorden både på friland og efterhånden mere og mere i jorden ved vore pottedplanter.

Myggen hører til slægten LYCORIA, en slægt med mange arter, bl. a. den lille *L.militaris*, der lægger sine æg om efteråret i fugtig, skyggefuld skovbund. Her lever larverne i titusindvis et godt og muntert liv. Men så kan det ske, der indtræffer en tørkeperiode, hvad der ikke passer larverne. Og i samlet folk begiver de sig nu på vandring for at opsøge nye madsteder. Disse tætte kolonner blev af vore forfædre i 1700-tallet betragtet med forfærdelse og opfattet som én stor uhyggelig orm: »HÆRORMEN«.

I dag er vi ikke så lette at forskrække med den slags sager, men glade er vi nu ikke, når den lille myg begynder at gå i vores kaktus.

Den myg, som hjemsøger os mest er vel nok: *Lycoria coprophila*, som er ca. 2 à 3 mm stor. Den lever overalt i det nordlige Europa, og måske de seneste varme somre og milde vintre har været den så gunstig, at den er blevet til så mange, så vi nu har den på besøg i vores urtepotter. Den lægger sine æg i de øvre jordlag og søger så vidt muligt potter med en del organisk materiale i jorden. Larverne, som er ca. 5 mm lange, tynde, næsten gennemsigtige

men med sort hoved, æder en del af de organiske bestanddele i jorden, men træffer de på en lille fristende rod, så går denne med i købet. Er der mange larver, går det ud over mange rødder, og rodhalsen er også med på spisesedlen. På mindre planter kan de fra rodhalsen æde sig ind i planten og udhule denne fra neden, og samtidig åbner larvernes gnaven for angreb af bakterier og svampe, og her kan det sidste næsten være værre end det første.

Man kommer bedst disse larver til livs ved at vande planterne med en opløsning af Lindan, eller måske bedre med Malation. Opløsningsforholdet står på flaskerne. Vand planterne med denne opløsning og gentag evt. vandingen efter 10 à 12 dage. Dog, husk at vente med at vande til planterne er begyndt at komme i groning, ellers kan man ødelægge mere på denne måde. De voksne myg kan man også reducere ved ophængning af fluefangerstrimler. Jeg glemte at fortælle, at har man planterne i drivhus, da vand også under eventuelle borde og lignende.

Mere kan jeg ikke fortælle om denne lille myg, men måske andre har gjort deres erfaringer med den og kan supplere denne lille sag.

Otto Forum Sørensen